

CONTROL DE ENFERMEDADES

BANANO



FUNGOSAS DE LA RAÍZ

Fusarium



Rizoctonia



NEMATODO FITOPATÓGENOS

Meloidogyne incognita



Pratylenchus



FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS, FLORES

SIGATOKA NEGRA
(*Mycosphaerella fijiensis*)



SIGATOKA AMARILLA
(*M. musicola*)



BACTERIANAS DE FOLLAJE

PUDRICIÓN BACTERIAL
(*Erwinia spp.*)



MOKO
(*Ralstonia solanacearum*)



APLICAR 10 DÍAS ANTES DEL TRASPLANTE, ES INDISPENSABLE INOCULAR CON MICROORGANISMOS BENÉFICOS JUSTO A LOS 10 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN. EN CULTIVO ESTABLECIDO SE PUEDE DESINFECTAR CON SOILCLEAN EN DOS APLICACIONES A DOSIS DE 5 L/Ha CON INTERVALO DE 5 DÍAS E INOCULANDO CON MICROORGANISMOS BENÉFICOS A LOS 5 DÍAS DESPUÉS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN

APLICAR



COMO COADYUVANTE A RAZÓN DE 1 L POR HECTÁREA

*

REVISAR
TABLA DE
COMPATIBILIDADES