



Conidios y metabolitos de *Trichoderma harzianum* Fungida Biológico - Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% EN PESO

<i>Trichoderma harzianum</i> (1X10 ⁷ UFC/ml)	70.00%
Metabolitos de <i>T. harzianum</i>	15.00%
Diluyentes y emulsificantes	15.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Concentrado soluble líquido, olor ácido fúlvico.

Densidad: 1.003 ±1

pH: 5.01 ±1

Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Micravita Trico Es un biofungicida a base de conidias y metabolitos de *Trichoderma harzianum*, los cuales son capaces de prevenir y controlar enfermedades por hongos fitopatógenos ya que compite con ellos por espacio y nutrientes, actuando como biocida y generando un microparasitismo. A su vez, los metabolitos poseen la capacidad de degradar las paredes celulares de los microorganismos, conidias y/o esclerocios provocando la lisis celular.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!

Con el equipo de protección adecuado. Abra el envase, gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente. Mida con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de **Micravita Trico** que vaya a utilizar en base al cultivo a tratar y viértala al tanque de preparación de la mezcla, conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, complete con agua el tanque y agite bien la mezcla, agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente. Asegúrese de lograr un buen cubrimiento del follaje ya que el producto actúa por contacto sobre la plaga. **UNA VEZ ABIERTO EL ENVASE UTILICE EL CONTENIDO TOTAL DEL PRODUCTO.**

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha) Vía Suelo	FRECUENCIA
Aplicación en charolas o semilleros	Preparar una solución de 500 ml del producto en 20 L de agua, aplique 2 L de dicha solución por semana, inyectándolo en el agua de riego para cada 100 charolas de planta	De 5-10 días posteriores a la emergencia y 7-10 días previo a trasplante
Hortalizas en general, berries y frutales	Aplicación al suelo: Aplicar de 1-2 L/ha, inyectando el producto en el sistema de riego o directamente a la zona de distribución de raíces absorbentes de los cultivos	En cultivos extensivos, 1-2 aplicaciones cada 30 días. En cultivos intensivos: 3-4 aplicaciones con espacio de 3-4 semanas.
	Aplicación foliar: 1-2 L/ha	Realizar tres aplicaciones: 1a temprano en floración, 2a de 10-12 días posteriores a la 1a aplicación y 3a en base a las condiciones favorables para la enfermedad.

Intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Foliar 4 horas al suelo 0 hrs.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde. Evitando su aplicación cuando existan fuertes vientos, lluvias y horas de calor intenso. Ya que favorece la pérdida de los componentes del producto o se dificulta su penetración.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; con temperatura ambiente estable no más de 40°C; lejos del fuego y fuentes de ignición. Alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

COMPATIBILIDAD: **Micravita Trico** es compatible con agroquímicos de uso común en la agricultura, sin embargo, si se desconoce la compatibilidad con algún producto, realizar una prueba antes de la mezcla final y previo a la aplicación en campo. No mezclar con bactericidas y cobre o en soluciones de pH menor a 5.

TOXICIDAD: **Micravita Trico** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Se considera ligeramente tóxico.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRESENTACIONES:



1 L



4 L



10 L



20 L



www.algachem.com.mx



contacto@algachem.com.mx



Carr. Los Pinos Km 1.5, Los Pinos
Ramos Arizpe, Coahuila. C.P. 25900

**CULTIVAMOS LEALTAD,
COSECHAMOS CONFIANZA**