



Regulador de Crecimiento Tipo 1

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% EN PESO

Ácido NaftalenAcético (ANA) (Ácido 2-(1-Naftil)acético)	0.28%
Ácido Indolbutírico (AIB) (Ácido 1h-Indol-3-butanoico)	0.02%
Acondicionadores	99.70%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Polvo gris, olor dulce

pH: 3.8 - 5

Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: **Raizota**, es un producto especialmente diseñado para inducir y estimar el crecimiento de raíces y el engrosamiento de tallos, por lo que se reduce el tiempo de adaptación de las plántulas al momento de ser establecidas en campo. Con la aplicación de **Raizota** se disminuyen las pérdidas de plántulas por trasplante permitiendo que se forme un sistema radicular abundante y eficiente traduciéndose en una mayor asimilación de agua y nutrientes para la planta.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!

Antes de aplicar, calibre su equipo de aplicación. Abra el envase con cuidado para evitar salpicaduras. Proceda a llenar $\frac{3}{4}$ partes del tanque de equipo de aplicación con agua y agregue la dosis a aplicar de **Raizota** posteriormente agregue el volumen de agua restante y agite bien, para obtener una solución homogénea y proceda a su aplicación. **Raizota** puede ser aplicado por equipo de aspersión manual, terrestre o aérea, en drench o vía foliar.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS (Kg/Ha)	RECOMENDACIONES
Chile, Jitomate, Fresa, Tabaco, Café, Papa, Cucurbitáceas, Frutales,	100 g/200 L de agua	En almácigos y charolas, aplicar una vez por semana, iniciando en la tercera semana del desarrollo de las plántulas
Ornamentales, Berenjena, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita, Cebolla, Ajo, Coliflor, Col, Brócoli, Nabo, Betabel, Acelga, Lechuga, Espinaca, Alcachofa,	100 g/100 L de agua	En campo, aplicar al trasplante
Espárrago, Zanahoria, Perejil, Cilantro, Rábano	400 g/100 L de agua	Aplicar en la segunda semana posterior al trasplante dirigiendo la aplicación a la base de la plántula
	0.5 - 1 Kg/Ha	Aplicar foliar, en la segunda y tercera semana de trasplante
	2 Kg/Ha	Aplicar en riego por goteo, disuelto en el agua de riego en la segunda, tercera y cuarta semana después del trasplante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, seguro, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; con temperatura ambiente estable y lejos del fuego. Alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

COMPATIBILIDAD: **Raizota**, solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos recomendados. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros productos antes de mezclar y previo a la aplicación en campo.

TOXICIDAD: **Raizota** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Se considera ligeramente tóxico.

PRESENTACIONES:



500 g



1 Kg



20 Kg



www.algachem.com.mx



contacto@algachem.com.mx



Carr. Los Pinos Km 1.5, Los Pinos
Ramos Arizpe, Coahuila. C.P. 25900

**CULTIVAMOS LEALTAD,
COSECHAMOS CONFIANZA**